


Exercice 1

Calc. : ✓

Saut de ski

Partie 1 Les parties 1, 2 et 3 de cette question peuvent être résolues indépendamment.)

La rampe d'un saut à ski est représentée ci-dessous et peut être modélisée par une fonction f .



Cette fonction f est définie dans l'intervalle tel que représenté sur le schéma et son expression analytique est :

$$f(x) = \frac{3}{10\,000}x^3 - \frac{1}{50}x^2 - \frac{11}{20}x + 70$$

où $f(x)$ et x sont exprimés en mètres.


- | | |
|---|---------|
| a) Utiliser l'expression analytique de la fonction et les informations lisibles sur le graphique pour déterminer le domaine de définition de f . | 2 marks |
| b) Calculer l'aire notée A sur le graphique. | 3 marks |
| c) Lorsqu'un skieur est au bout de la rampe, les skis se placent dans la 4 position de la tangente t au graphique de la fonction f . Donner l'équation de cette tangente en précisant toutes les étapes de votre démarche. | 4 marks |
| d) Imaginons le skieur au point le plus bas de la rampe. Calculer la hauteur de ce point le plus bas. Expliquer votre démarche. | 4 marks |

Partie 2

Utiliser les définitions suivantes pour les parties 2 et 3 :

- La position d'un objet est déterminée par la fonction s du temps t , soit $s(t)$, telle que t est exprimé en secondes et $s(t)$ est exprimée en mètres.
- La vitesse est la fonction v telle que $v(t) = s'(t)$.
- L'accélération est la fonction a définie telle que $a(t) = v'(t)$.

Après avoir décollé de la rampe, le skieur vole dans les airs jusqu'à ce qu'il atterrisse sur le sol. Le temps entre son envol et son atterrissage est d'exactly 3 secondes. Le graphique de la fonction v , vitesse du skieur en fonction du temps, avec $v(t)$ en m/s est représenté dans le repère ci-dessous (t en secondes).



- e) **Trouver** la vitesse du skieur (en m/s) à laquelle il atterrit sur le sol. 1 mark
- f) Utiliser les informations chiffrées données sur le diagramme pour **calculer** une valeur approchée de la surface de l'aire notée A . **Expliquer** votre démarche. 3 marks
- g) Est-ce que la valeur approchée de la surface de l'aire A calculée à la question f) est une sous-évaluation ou une surévaluation de l'aire exacte ? **Justifier** votre réponse. 2 marks
- h) **Interpréter** ce que représente la surface exacte de l'aire A dans le contexte donné. 2 marks

Partie 3

Lorsque le skieur atterrit sur la piste, il ralentit jusqu'à ce qu'il s'immobilise complètement. La vitesse du skieur sur la piste à partir du moment de son atterrissage peut être modélisée par la fonction suivante :

$$v(t) = -3,4 \cdot t + 28,9$$

où t est en secondes et $t = 0$ correspond au moment où le skieur touche le sol.

- i) Combien de temps faut-il au skieur pour ralentir jusqu'à l'arrêt complet ? **Justifier** votre réponse. 2 marks
- j) **Vérifier** si une piste d'atterrissage de 120 m est assez longue pour permettre au skieur de s'arrêter. 2 marks



Exercice 2

Calc. : ✓

L'île

Partie 1 (Les parties 1 et 2 de cette question peuvent être résolues indépendamment.)

Le tableau ci-dessous donne la population recensée sur une île.

Début de l'année	2015	2020
Population	5 500	7 250

- a) Utiliser un modèle affine pour **prévoir** la population au début de l'année 2023. 2 marks
- b) Pierre utilise un modèle exponentiel $p(t) = k \cdot a^t$ pour modéliser la 3 population. Dans ce modèle, $t = 0$ correspond au début de 2015 et, a et k sont des paramètres.
Calculer les valeurs des paramètres a et k de la fonction $p(t)$. 3 marks
- c) **Montrer** que le modèle exponentiel $f(t) = 5\,500 \cdot e^{0,05525t}$ correspond bien aux données. 2 marks

Pour les questions d), e), f), vous pouvez utiliser le modèle :

$$f(t) = 5\,500 \cdot e^{0,05525t}$$

Dans ce modèle $t = 0$ correspond au début de l'année 2015.

- d) **Déterminer** le taux de croissance annuel du modèle exponentiel. 2 marks
- e) **Calculer** $f'(5)$ et **interpréter** à quoi correspond cette valeur dans le contexte donné. 2 marks
- f) Utiliser le modèle exponentiel pour **trouver** en quelle année la population atteindra 10 000 personnes. 3 marks

Au début de 2022, l'île a été frappée par un tremblement de terre. Bien que personne n'ait été blessé dans l'événement, 6 000 personnes ont décidé de quitter l'île immédiatement. Après leur départ, le taux de croissance de la population de l'île est resté le même qu'avant le séisme.

- g) **Chercher** en quelle année la population de l'île sera à nouveau la même qu'au début de 2015. 3 marks

Partie 2

La longueur du jour est le temps compté entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Pierre vit sur l'île et mesure la longueur du jour de chaque premier jour du mois durant une année entière (non bissextile). Les mesures sont données ci-dessous :

Date	1 ^{er} janvier	1 ^{er} février	1 ^{er} mars	1 ^{er} avril	1 ^{er} mai	1 ^{er} juin
Durée du jour (en heures)	7,67	8,55	10	11,2	12,33	13

Date	1 ^{er} juillet	1 ^{er} août	1 ^{er} septembre	1 ^{er} octobre	1 ^{er} novembre	1 ^{er} décembre
Durée du jour (en heures)	13,05	12,67	11,6	10,35	8,95	7,83

Pierre modélise la durée du jour $h(x)$ avec le modèle périodique $h(x) = a \cdot \sin(b(x - c)) + d$, où $h(x)$ est exprimée en heures, x est exprimé en jours et $x = 1$ correspond au premier janvier.

- h) **Expliquer** pourquoi la durée du jour peut être modélisée par une fonction périodique et **donner** la période de cette fonction. 2 marks
- i) **Estimer** l'amplitude de ce modèle périodique. 2 marks
- j) En conséquence, **rechercher** les valeurs des paramètres a , b , c , et d qui correspondent le mieux au modèle périodique $h(x)$. 4 marks